

Your child has a procedure scheduled.

Please read all instructions before your child's procedure.

- Clear Liquids **only** for 8 hours before the procedure

CLEAR LIQUIDS are liquids you can see through and include:

- Clear fruit juices without pulp
- Water, vitamin water, flavored water
- Clear chicken broth or bouillon (not beef)
- Gatorade, Powerade, Kool-aid, Pedialyte
- Plain Jello (without added fruits or toppings)
- Ice popsicles

*****NO RED, BLUE, OR PURPLE DYES**

- Nothing to eat or drink for 4 hours before the procedure.
- Regular medications can be given up to four hours before the procedure. Please reach out to your clinical team if taking GERD treatment medications to see if they need to be stopped prior to the procedure.

Please check in **2 hours** before the procedure.

Please contact our office with any questions or concerns about the procedure: **602-933-0940**.



El niño tiene un procedimiento programado.

Lea todas las instrucciones antes del procedimiento del niño.

- Líquidos claros **solamente** durante las 8 horas antes del procedimiento.

LÍQUIDOS CLAROS: son líquidos transparentes. Ejemplos:

- Jugos de fruta claros sin pulpa
- Agua, agua vitaminada, agua saborizada
- Caldo de pollo claro y consomé (no de carne)
- Gatorade, Powerade, Kool-aid, Pedialyte
- Gelatina natural (sin ningún agregado, ni siquiera frutas)
- Helados de agua

*****SIN COLORANTES ROJOS, AZULES NI MORADOS**

- NO PUEDE comer ni beber absolutamente nada durante las 4 horas antes del procedimiento.
- Puede tomar los medicamentos habituales hasta 4 horas antes del procedimiento. Llámenos si toma medicamentos para el reflujo gastroesofágico para averiguar si tiene que suspenderlo antes del procedimiento.

Regístrese **2 horas** antes del procedimiento.

Comuníquese con el consultorio si tiene preguntas o dudas sobre el procedimiento: **602-933-0940**.

